



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius diosmus* Kühner

Nom français : Cortinaire à deux odeurs

Sous feuillus. Chapeau couvert de voile blanc sur fond crème ochracé. Lames crème puis rouillées. Stipe blanchâtre couvert d'un voile cotonneux, base bulbeuse plus ou moins garnie de voile et formant une pseudovolve (alors parfois placé en *var. araneosovolvatus*). Chair blanchâtre à ochracée. Saveur douce. Odeur d'abord de rave (parfois fugace), puis fruitée (mirabelle) quelques minutes après la cueillette. Spores 8-10 x 5-6  $\mu$ m.

L'ensemble des caractères de ce cortinaire le rendent difficile à confondre, de plus il est assez fréquent dans la région, sur le littoral et à l'intérieur des terres, souvent sous chênes verts, entre les mois d'octobre et de décembre.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR.

*Fiche réalisée en mai 2019 par Patrice TANCHAUD*



Nous présentons ici des récoltes réalisées sous chênes verts à l'intérieur des terres (Soulignonne et Le Douhet) ayant les caractères de *C. diosmus*, mais les spores nettement subglobuleuses nous interpellent, dans l'immédiat nous ne voyons guère mieux que de les placer sous le même binôme.

