



Ordre : *Thelephorales*

Famille : *Bankeraceae*

Phellodon melaleucus (Schwein.) P. Karst.

En forêt. Fructification piléée et stipitée. Chapeaux souvent concrescents, gris brun à jaune brun par temps sec, brun foncé à l'état imbu, marge blanchâtre. Hyménium formé d'aiguillons blancs puis brunâtre grisâtre. Stipe lisse à fibrilleux, structure simple. Chair réagissant en vert au KOH. Spores 3,5-4,5 x 3-4 µm. A comparer surtout avec *P. confluens*, dont le stipe est fibrilleux, à structure double (médullaire dure), et chair qui ne réagit pas au KOH. Personnellement, nous ne trouvons pas que les différences soient évidentes, notamment par exemple la réaction au KOH ...

P. niger ne réagit pas non plus en vert au KOH, mais son chapeau est nettement coloré de bleu noir puis noir.

A noter également ce petit comparatif sur deux genres ressemblants :

- *Phellodon* : odeur de « Maggi » ou « bouillon cube », sporée blanche, spores ne dépassant pas 4,5 µm ;
- *Hydnellum* : odeur farineuse, acidulée, anisée ..., sporée brune, spores dépassant souvent 4,5 µm.

Ce *Phellodon* n'est pas présent tous les ans, mais certaines années, nous l'avons rencontré en grandes troupes sur différentes stations en Charente-Maritime et Charente, à l'intérieur des terres l'été et l'automne, ainsi que sur le littoral l'hiver.

Biblio : BK2 269.





