



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius infractus (Pers. : Fr.) Fr.

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau fibrilleux, gris-brun à brun olive, centre plus ou moins décolorant en ochracé. Lames gris-brun olive. Stipe brun grisâtre avec reflets bleutés ou olivâtres. Saveur typiquement amère. TL4 jaune vif sur cuticule et gaïac bleu vif sur chair. Spores 7-8,5 x 5,5-6,5 µm, subglobuleuses.

A comparer avec quelques espèces de la série du même nom, par exemple :

- *C. obscurocyaneus* : semble ne se distinguer que par ses couleurs du chapeau plus sombres ;
- *C. anfractoides* : espèce robuste à chapeau plus ou moins gris, gaïac nul sur chair ;
- *C. pallidogriseus* : sous conifères, chapeau gris, gaïac bleu-vert sur chair ;
- *C. amaroaerulescens* : chapeau violacé lilacin à gris-rose violacé, binôme bien délicat à séparer à notre avis, et que nous pourrions par exemple être tenté de retenir pour la récolte ci-dessus à droite.

Espèce très fréquente dans la région entre fin septembre et début janvier, tant sur le littoral qu'à l'intérieur des terres. A noter également une certaine ressemblance avec *C. dionysae*, autre cortinaire à écologie similaire, mais l'odeur farineuse de ce dernier lève rapidement tout doute.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al. - GEPR.



TL4





