



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

Leucoagaricus pilatianus (Demoulin) Bon & Boiffard

Nom français : Lépiote de Pilat

Dans les bois, les parcs. Chapeau d'aspect velouté, subfibrilleux, brun-rose à châtain vineux. Lames blanchâtres. Stipe blanc, brunissant par la base, anneau ample. Cuticule verdissant à l'ammoniaque. Spores 6-7,5 x 3-4 µm. Cheilocystides cylindro-clavées.

Existents les var. *rimosovelatus* (chapeau rimeux avec restes de voiles), var. *salmonephyllus* (lames jaunâtres puis rosé saumon) et var. *subrubens*.

A comparer avec quelques espèces à NH₃ positif et cheilocystides également sans col :

- *L. purpureolilacinus* : chapeau plus pâle à mamelon cerné de sombre avec le centre décoloré, spores plus grandes, cheilocystides souvent cristallifères ;
- *L. aurantiovergens*, *L. marginatus*, *L. croceobasis* et *L. cupresseoides* sont à envisager lors de récoltes sous *Cupressus*.

Probablement peu fréquente, cette belle espèce est néanmoins visible chaque année sur certains secteurs du littoral, Galon d'or, îles d'Oléron, de Ré et d'Aix, où nous la rencontrons en forêts mêlées et sous *Cupressus*, plus exceptionnellement à l'intérieur des terres.

Biblio : DM HS n° 3 - Cetto 2602 - GEPR.



