



Ordre : *Hymenochaetales*

Famille : *Hymenochaetaceae*

Phellinus igniarius (L. : Fr.) Quél.

Nom français : Faux-amadouvier

Sur saule vivant, parfois sur d'autres feuillus. Fructification gris-brun à noire, en forme de console avec de larges bourrelets. Hyménium brunâtre. Trame brun foncé. Spores 5-6,5 x 4,5-6 µm, non dextrinoïdes. Voir comparatif d'espèces ou variétés page 2.

Ce polypore est loin d'être présent dans toutes les saulaies, nous l'avons rencontré sur son essence de prédilection à Ronce les Bains, St Porchaire et Montendre, ainsi qu'en Charente dans les secteurs de Touvérac, Brossac et Brigueuil où l'espèce est plus largement répandue.

Biblio : Polyporaceae Bernicchia - BK2 316 - Bull. SMF 108 (1992) fasc. 2 (53-69).

Fiche réalisée en mai 2018 par Patrice TANCHAUD

A comparer avec quelques espèces similaires et délicates de détermination, avec des distinctions non évidentes, parfois contradictoires selon les ouvrages, ou alors synonymisées ou placées en variété par certains auteurs. Nous tentons de réaliser ci-dessous un petit résumé des pages 395-398 de l'ouvrage de Bernicchia, de parution récente et qui nous sert donc de référence :

- *P. trivialis* ou *P. igniarius* var. *trivialis*, non confirmé comme étant une espèce distincte, les récoltes réalisées sur saule sont attribuables à *P. igniarius* ;
- *P. nigricans*, confirmé comme étant une espèce distincte poussant de préférence sur bouleau ;
- *P. alni*, sur feuillus divers mais pas sur saule, chair densément zonée, spores ne dépassant pas 4,5 μm de large ;
- *P. cinereus*, espèce distincte de *P. igniarius*, sur bouleau, tilleul et aulne.
- *P. populicola*, lié au peuplier ;
- *P. lundelli*, sur bouleau et autres feuillus, plus résupiné ;
- *P. robustus*, sur chêne et parfois autres feuillus, moins ongulé, trame brun cannelle, spores dextrinoïdes.

