



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius albidogriseus Bidaud & Reumaux

Sur sol calcaire, écologie restant à définir. Chapeau légèrement visqueux, parcouru de fines fibrilles innées, gris-bleu blanchâtre argenté, puis grisâtre avec le centre ochracé, marge enroulée. Lames mauves puis beige grisâtre, rouille avec l'âge. Stipe blanchâtre avec un bulbe marginé. Chair blanchâtre grisâtre. Odeur fruitée puis acide, saveur douce. KOH sans particularité. Spores 9-10,5 x 6-6,5 µm.

Récolte réalisée début novembre 2010 en compagnie de M. Patrick Boisselet, sous majorité chênes dans les bois de Champagne. Nous suivons ici la détermination de notre collègue, en réalisant une fiche complémentaire à la sienne, permettant d'y ajouter une coupe et les spores. Taxon de la Section *Caerulescentes* Série *Rapaceus*, proche de *C. boudieri*, groupe restant encore à débrouiller, raison pour laquelle nous espérons réaliser de nouvelles récoltes de ce cortinaire peu commun et peu connu afin de pouvoir évaluer son autonomie et sa variabilité.

Biblio : ADC Bidaud et al.

Fiche réalisée en janvier 2017 par Patrice TANCHAUD