



Ordre : *Agaricales*

Famille : *Secotiaceae*

Lepiota boudieri Bresadola

Synonyme : *Lepiota fulvella*

Nom français : Lépiote de Boudier

Dans les taillis de feuillus. Chapeau fibrillo-squamuleux, brun-roux orangé à brun fauve, parfois à reflets olivâtres. Lames blanches. Stipe blanc au sommet, cotonneux à guirlandé en bas par un voile concolore au chapeau. Odeur faible à aromatique. Spores 7,5-10 x 3,5-4 µm, éperonnées. Poils de la cuticule plus ou moins cloisonnés, à pigment vacuolaire brun-jaune.

Deux autres taxons présentent des poils ainsi pigmentés :

- *L. fulvella* : distingué par le passé au vu des poils cuticulaires non cloisonnés mais semble synonyme ;
- *L. acerina* : également bien proche, séparé au vu de ses teintes de chapeau différentes (mais synonymisé chez Funga nordica).

Nous rencontrons cette lépiote chaque année, entre les mois d'août et d'octobre dans différents milieux frais, par exemple dans les secteurs de Cadeuil, Bussac/Charente, Villars les bois, Chives...

Biblio : littérature courante - DM HS n° 3 p. 53 – GEPR - Funga nordica.



