



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Leccinum lepidum (Letellier) Watling

Noms français : Bolet joli, Bolet des chênes verts

Sous chênes verts, également sous chênes-lièges dans le sud de la France. Chapeau gras, plus ou moins cabossé, brun-jaune, brun sombre à ochracé. Pores jaunes puis jaune verdâtre. Stipe trapu, jaune à roussâtre. Chair jaunâtre devenant gris rosâtre, gris violacé à noirâtre à la coupe, parfois subimuable. Odeur d'iode fréquente à la base du stipe. Spores 14-20 x 5-7 µm.

Ce bolet est typique par son aspect et son écologie, il est souvent confondu avec les cèpes (*Boletus edulis* et *Boletus aestivalis*). A noter également la ressemblance avec *L. crocipodium*, espèce estivale poussant sous d'autres feuillus, à chapeau plus clair et sec.

Ce *Leccinum* est fréquent sur le littoral, par contre à l'intérieur des terres, il peut être quasiment absent certaines années et très abondant à d'autres. Nous l'avons occasionnellement rencontré l'été, mais il est plutôt tardif, les mois de novembre et décembre étant ses mois de prédilection ; il n'est pas rare de le voir encore en janvier ou février, même en avril, mais là nous ne savons pas dire s'il est alors tardif ou précoce...

Biblio : littérature courante - Monographie des *Leccinum* d'Europe, G. Lannoy et A. Estades - GEPR.

Fiche réalisée en juillet 2023 par Patrice TANCHAUD





