



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula anthracina Romagnesi

Nom français : Russule anthracite

En forêt de feuillus, plutôt sur sols frais. Chapeau gris fuligineux à brunâtre noirâtre. Lames assez serrées, blanches à reflets plus ou moins rosâtre carné (alors nommé *var. carneifolia*), grisonnantes et noircissantes. Stipe blanc puis noircissant. Chair noircissante, rougissement nul, ou discret et simultané au noircissement. Saveur douce, lames plus ou moins âcres. Fer verdâtre. Sporée 1a. Spores 8-10 x 6,5-8 µm. Dermatozystides absentes.

Cette espèce semble assez typique dans la Section *Compactae*. A noter l'existence de *R. anthracina var. insipida* à saveur douce qui pourrait être confondue avec *R. albonigra* (lames moins serrées, blanc pur et noircissant rapidement).

Voir également *R. densifolia* qui rougit avant de noircir et qui possède des dermatocystides.

Russule moyennement fréquente dans la région, nous la rencontrons occasionnellement sur le littoral ou à l'intérieur des terres, à la période automnale, parfois dès les mois d'été lorsque les conditions météorologiques sont favorables.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - *Russula Sarnari*.



