



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula maculata Quélet & Roze

Nom français : Russule maculée

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau rouge orangé à rosâtre ochracé (parfois non pigmenté, cf. page 2), typiquement maculé de rouille pourpré. Lames blanches puis jaune ochracé. Stipe blanc parfois taché de rose. Chair douceâtre, lames légèrement à assez âcres. Gaïac nul ou très faible sur stipe et lames. Sporée 4c. Spores 8-10 x 7-8,5 µm à verrues isolées reliées par de fins connectifs. Dermatozystides cloisonnées.

A comparer avec des espèces poussant également sous feuillus, à couleur de sporée proche :

- *R. nymphaeum* : lames très âcres, réaction faible au gaïac, présence de larges dermatocystides ;
- *R. globispora* (plusieurs espèces dans ce groupe en cours d'étude) : chapeau souvent plus pâle, gaïac vif et rapide, spores plus grandes ;
- *R. rubroalba* : chair et lames douces, spores à réseau presque complet ;
- *R. juniperina* : chapeau rouge orangé brillant, chair légèrement âcre, spores à verrues isolées ;
- *R. decipiens* : stipe grisonnant avec l'âge, gaïac vif sur stipe et lames, présence de dermatocystides non cloisonnées.

Cette russule est visible chaque année dans notre région, l'été et l'automne, parfois dès le mois de mai.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari - GEPR.



