



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula atropurpurea (Krombholz) Britzelmayr

Synonymes : *R. krombholzii* ; *R. krombholzii* var. *depallens*, ***R. undulata*** (nom prioritaire actuellement que nous adopterons éventuellement à l'avenir)

Nom français : Russule pourpre et noir

En forêt. Chapeau rouge-violet (teintes parfois peu ou pas visibles), plus ou moins sombre et décoloré par plages, souvent maculé de rouille. Lames blanches à crème. Stipe grisonnant, pouvant être taché de jaune rouillé à la base. Saveur douce ou légèrement âcre. Odeur faible de pomme. Sporée 1a. Spores 8-9,5 x 6,5-7,5 µm.

Attention à *R. poikilochroa* qui peut être un véritable sosie, cette russule pousse essentiellement sous chênes, elle est plus petite, son stipe reste blanc, ses spores sont subglobuleuses et nettement réticulées.

Espèce fréquente dans la région, visible généralement l'automne, mais parfois dès l'été lorsque les conditions sont favorables aux poussées. A noter que l'odeur de pomme et l'âcreté indiquées dans la littérature sont parfois peu évidentes.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - *Russula Sarnari*.





