



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula foetens Pers. : Fr.

Nom français : Russule fétide

En forêt. Chapeau très visqueux, lisse puis longuement cannelé-silloné, ocre fauvâtre à brun-roux. Lames crème se tachant de rouille, parfois avec l'arête colorée de brun rouille. Stipe blanc à roussâtre. Chair blanche. Odeur puissante et désagréable, dite « de corne brûlée ». Saveur très âcre. KOH nul ou faible sur le stipe. Sporée 2a-2c. Spores 7,5-10 x 6,5-8 µm à ornementation isolée.

Dans notre secteur, à comparer surtout avec *R. subfoetens*, généralement moins robuste, à chapeau rapidement sec, à odeur moins désagréable et saveur moins piquante ; sa chair jaunit légèrement à la coupe et le KOH donne une réaction jaune d'or sur le stipe.

Attention à deux espèces méditerranéennes, peut-être à rechercher sur notre littoral :

- *R. putida* : plutôt sous pins et cistes, spores plus ou moins crêtées ;
- *R. inamoena* : spores subglobuleuses avec de fortes crêtes.

Cette russule est visible chaque année dans la région, dès l'été si les conditions sont favorables, et également l'automne.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.