



Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

## ***Melastiza cornubiensis*** (Berk. & Br.) Moravec

Synonyme : *Melastiza chateri*

Souvent sur terre nue, en troupes. Apothécie rouge orange vif, marge garnie de poils utriformes très courts, groupés en touffes. Spores 17-19,5 x 9-10  $\mu\text{m}$ .

Avec des spores plus ou moins ressemblantes, à comparer avec :

- *M. flavorubens* : spores légèrement plus petites (15-18 x 7-9  $\mu\text{m}$ ) ornées d'un réseau incomplet avec des nœuds aux angles des mailles ;
- *M. boudieri* : spores 16,5-19,5 x 9,5-12,5  $\mu\text{m}$  (sans ornementation) avec de grosses pustules irrégulièrement réparties et fortement agglomérées aux pôles ;
- *Scutellinia pseudotrechispora* : spores ornées de crêtes formant un réseau presque complet (18-21 x 11-13,5  $\mu\text{m}$ ), présence de courts poils bruns (120-320  $\mu\text{m}$ ) à sommet aigu et base simple ou bifurquée (typiques du genre).

Espèce très fréquente dans notre région, visible tous les mois de l'année, souvent sur terre en bordure de chemins ou de champs, mais aussi sur sols souillés, déchets de légumes, râpes de vendanges, etc.

Biblio : littérature courante.



