



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

Amanita citrina (Sch. : Fr.) S.F. Gray

Nom français : Amanite citrine

En forêt. Chapeau jaune pâle couvert de plaques concolores ou plus brunes. Lames jaunâtres. Stipe avec un bulbe nettement marginé, anneau ample. Forte odeur, de pomme de terre pour certains, plutôt raphanoïde pour d'autres. Spores 7,5-9,5 μm , globuleuses ou presque.

Nous associons deux variétés, cf. pages 2 à 4 : *A. citrina* var. *alba* (chapeau blanc) et *A. citrina* f. *crassior* (port plus massif et bulbe nettement napiforme).

A comparer avec :

- *A. brunnescens* (syn. *A. asteropus*) : plus grand et élancé, chapeau crème maculé de brun madère dans les blessures, base du stipe « étoilée » ;
- *A. intermedia* : en montagne, sous conifères ou hêtres, chapeau brun jaunâtre à brun grisâtre.

Cette amanite est très fréquente. Nous avons néanmoins remarqué que sa période d'apparition semble démarrer au mois de septembre pour se poursuivre ensuite en grand nombre entre octobre et décembre. Les observations dès juillet ou août paraissent exceptionnelles, même lors d'été favorables lorsque d'autres espèces sont bien présentes dans les sous-bois.

Biblio : littérature courante - Phytotaxa 440 (1): 055-068, 2020.



Ci-dessus : récolte pouvant présenter *A. citrina* f. *crassior*.

Ci-contre : récolte atypique réalisée en décembre 2019 à Ronces les Bains.

Page suivante : trois photographies de la forme blanche.



