



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson

Synonyme : *Coprinus micaceus*

Nom français : Coprin micacé

Croissance fasciculée sur souches et débris de feuillus. Chapeau brun roux, couvert de fins flocons blancs fugaces, pâliissant à la marge. Stipe blanc, pubescent (loupe). Spores 8-10 x 4-6,5 µm plus ou moins mitriformes et présence typique de soies sur le stipe. A comparer avec les espèces proches de la même section. Nous proposons un tableau comparatif en page 2, issu de la littérature à notre disposition.

Ce coprin est très fréquent dans notre région, il est possible de le rencontrer à toutes saisons.

Biblio : littérature courante - Studies in Coprinus d'Ulje - Ehrhard Ludwig, Pilzkompendium Band 1 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin) - BK4 294 - Mille et un champignons P. Roux.

Fiche réalisée en mai 2015 par Patrice TANCHAUD

Section Micacei : en touffe sur les souches. Voile granuleux composé de sphérocyistes.
 Synthèse ouvrages Uljé, M. Citérin, P. Roux, E. Ludwig, BK4, GEPR

	<i>soies stipe</i>	<i>spores</i>	<i>flocons voile piléique</i>	<i>fréquence</i>	<i>observations</i>
<i>micaceus</i>	oui	nettement mitriformes	brunâtre au centre du chapeau, fugace et souvent peu visible	commun	le seul avec voile peu visible et spores mitriformes
<i>pallidissimus</i>	oui	Elliptiques à ovoïdes	voile se rompant en petites écailles brunâtres au centre du chapeau	très rare	couleurs pâles. Voile écaillé. Cheilos et pleuros nombreuses
<i>saccharinus</i>	non	submitriformes - brun foncé	blanc pur sur tout le chapeau	peu fréquent	chapeau entièrement recouvert de flocons blancs
<i>truncorum</i>	non	submitriformes - brun clair	brunâtre au centre du chapeau	rare	voile teinté de brun au centre du chapeau



