



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Lactarius hyginus (Fr. : Fr.) Fr.

Synonyme : *L. curtus*

Noms français : Lactaire court, Lactaire cireux

Sous épicéas, peut-être également sous feuillus ? Chapeau gras à visqueux, plus ou moins zoné concentriquement, brun rougeâtre pourpré à ochracé rosâtre orangé. Lames crème jaunâtre pâle. Stipe blanchâtre à subconcolore au chapeau, plus ou moins scrobiculé. Odeur forte plutôt désagréable, dite « aromatique » ou de « cire à cacheter ». Lait blanc, immuable et âcre. Spores 6-8,5 x 5-6,5 µm. Avec une écologie similaire, à comparer surtout avec :

- *L. trivialis* (synonyme ou différent de *L. utilis* selon les auteurs) : chapeau gris-brun à brun lilacin, stipe creux souvent gorgé d'eau, odeur fruitée, lait séchant en beige olivâtre sur les lames ;
- *L. zonarioides* : chapeau brun orangé assez vif et zoné, odeur fruitée, spores nettement plus grandes ;
- *L. flexuosus* : chapeau sans teintes roses, généralement zoné.

Ce lactaire est probablement peu fréquent dans la région, nous le récoltons occasionnellement à Brigueuil (16), entre les mois d'octobre et de décembre, tout à fait dans l'écologie indiquée dans le GEPR (« *ce lactaire apprécie souvent les endroits perturbés par les activités humaines des bois d'épicéas, bord de chemins, sentiers, etc.* »).

Biblio : littérature courante - *Lactarius* Pers. M.T. Basso - GEPR.

Fiche réalisée en avril 2020 par Patrice TANCHAUD



