



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula versicolor J. Schaeffer

Nom français : Russule versicolore

Sous bouleaux. Chapeau brillant, pourpre vineux à rose lilas, mais aussi plus ou moins crème verdâtre ou jaune ochracé, marge cannelée. Lames crème ochracé à maturité. Stipe blanc, jaunissant. Odeur légèrement fruitée. Saveur douce, un peu âcre dans les lames. Gaïac vif et rapide. Sporée 2d-3b(3c). Spores 6-7,5 x 5-6 µm subréticulées. Il existe dans la littérature quelques variétés difficiles à distinguer (*var. intensior*, *var. major*), ainsi que quelques taxons controversés et non retenus dans les ouvrages récents (*R. unicolor*, *R. pseudopuellaris*). A comparer surtout avec :

- *R. puellaris* et *R. terenopus* (sporée 2c), *R. versatilis* (sporée 3b-3c) : hôtes différents ;
- *R. exalbicans* : sous bouleaux et sporée similaire, mais tendance au grisonnement et gaïac faible ;
- *R. gracillima* : sous bouleaux, petite espèce, sporée 2a, gaïac faible.

Dans la région, cette espèce est assez fréquente dans quelques secteurs avec bouleaux. Sur le terrain, la prudence doit être de mise, plusieurs espèces peuvent aisément pousser en mélange, un contrôle minutieux des sporées, des réactions au gaïac, etc., ne sont pas superflus.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.

