



Montendre, sept. 2012



Brossac, sept. 2015

Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius bibulus* Quélet

Synonymes : *C. pulchellus*, *C. lilacinopusillus*

Noms français : Cortinaire bibelot, Cortinaire violet des aulnes

Sous aulnes dans les milieux humides. Chapeau 3-15 mm, fibrilleux, violet sombre, brun-violet à gris-violet clair, hygrophane et perdant ses teintes lilacines en séchant. Lames assez espacées, violet clair puis brun-violet. Stipe fibrilleux, brun violacé pâle. Chair violette, odeur et saveur sans particularité. Spores 8,5-11,5 x 5-6,5  $\mu\text{m}$ .

Avec une écologie similaire, à noter l'existence de *C. alnetorum*, il est un peu plus gros avec un chapeau fortement voilé de grisâtre et dépourvu de tons violets.

C'est dans son écologie de prédilection que nous avons déniché ce petit cortinaire personnellement, ou en compagnie de notre ami Robert Lagarde, l'été et l'automne. Il est à noter que les exemplaires de Brossac étaient nettement plus violets que ceux de Montendre. Nous l'avons également observé à St Bris des bois et Brigueuil, parfois dès le mois de juillet.

Biblio : littérature courante - BK5 297.

**Brossac, sept. 2015**



**Montendre, sept. 2013**



**Montendre, août 2013**



**Montendre, oct. 2013**



**Montendre, sept. 2013**

