



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius cinnamomeoluteus Orton

Nom français : Cortinaire jaune cannelle

Plutôt sous les saules, en milieu humide. Chapeau feutré, jaune olivâtre, jaune ochracé à brun-orangé (sans tons rouges), souvent mamelonné. Lames jaunes puis jaune rouillé. Stipe jaune olivâtre. Chair jaune pâle, odeur et saveur sans particularité. Spores 7,5-11 x 5-6,5 µm.

Dans notre région et venant également sous saules, à comparer avec *C. uliginosus* qui a un chapeau et un stipe orange cuivré à rouge brique.

Voir la fiche de *C. croceus* pour d'autres espèces plus ou moins ressemblantes mais à écologie différente (conifères ou bouleaux). Attention également à :

- *C. tubarius* : sous bouleaux en milieux humides, chapeau brun-jaune à brun-rouge, lames à teintes verdâtres ;
- *C. olivaceofuscus* : sous d'autres feuillus, tons plus olivâtres, chair plus sombre à nette odeur de rave et spores plus petites.

Ce cortinaire nous paraît peu fréquent, nous le connaissons dans les tourbières de Brigueuil (16) où il pousse de la fin de l'été à l'automne.

Biblio : littérature courante - Flora photographica - GEPR p. 710.