



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius nanceiensis Maire

Nom français : Cortinaire de Nancy

Sur sol calcaire, sous feuillus ou conifères. Chapeau visqueux, d'abord jaune-brun à marge légèrement verdâtre, puis brun-rouillé lavé d'olivâtre ou de purpurin, centre plus sombre. Lames jaune verdâtre. Stipe jaune verdâtre pâle, plus ochracé vers le bas, voilé de fibrilles brun pourpré, base plus ou moins différenciée (les récoltes bulbeuses sont nommées *C. bulbopodius*). Chair jaune verdâtre, odeur fruitée, dite « de banane verte », saveur douce. KOH olive sur la cuticule, rougeâtre sur la chair. Spores 10-12 x 6-7 µm.

Voir la fiche de *C. aurilicis*, espèce à comparer et très ressemblante.

C. nanceiensis est un cortinaire qui se rencontre l'automne, aussi bien dans nos forêts de feuillus qu'en forêts mixtes. Pour le moment, nous traitons ce taxon au sens large, incluant *C. bulbopodius* (égal *C. nanceiensis* var. *bulbopodius*), d'ailleurs placé en variété de *C. aurilicis* dans l'ouvrage *Funga nordica* ...

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al.

