



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius pseudophlegmus Henry

Souvent sous chênes. Chapeau sec, finement fibrilleux, très hygrophane, grisâtre lilacin à gris bleuté puis crème ochracé avec l'âge. Lames bleu lilacin puis rouillées. Stipe subconcolore au chapeau avec la base plus ou moins bulbeuse, marginée ou en oignon. Chair blanchâtre, violetée dans le stipe. Odeur et saveur sans particularité. Spores 7-8,5 x 4,5-5 µm.

A comparer avec :

- *C. pseudomalachius* : assez ressemblant, également sous feuillus, chapeau non hygrophane, odeur raphanoïde ;
- *C. malachius* : sous conifères, chapeau peu hygrophane, spores plus grandes.

Cortinaire probablement peu fréquent, voire assez méconnu. Nous l'avons rencontré à trois reprises :

- photographie page 3 : octobre 2017 en forêt de Brigueuil, sous chênes et hêtres ;
- photographies ci-dessus : septembre 2023 à Ronce les Bains, sous chênes, peupliers et pins ;
- photographie page 2 : début décembre 2023 sur l'île de Ré, sous chênes verts.

Biblio : ADC Bidaud et al. - GEPR.



