



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Lyophyllaceae*

Myochromella boudieri (Kühn. & Romagn.) V. Hofstetter et coll.

Synonymes : *Tephroclybe boudieri*, *Lyophyllum boudieri*

- Synonyme possible : *T. albofloccosa* (chapeau plus pâle et stipe moins pruineux)

Nom français : Tephroclybe de Boudier

Surtout sous feuillus. Chapeau 2-4 cm, hygrophane, ocre brun puis ocre grisâtre, marge plus pâle et striée. Lames crème pâle. Stipe subconcolore au chapeau, typiquement moucheté de petits flocons blanc argenté. Odeur farineuse, ou plutôt d'huile de lin ou de foie de poisson (rappelant celle de *Macrocystidia cucumis*). Spores 6-9 x 3-4,5 µm.

A noter l'existence d'une espèce sosie, *M. inolens*, qui ne se distingue que par l'absence d'odeur, ou seulement à peine farineuse.

Espèce probablement peu fréquente sur nos terrains de prospection, la récolte présentée ici a été réalisée en compagnie de notre collègue Robert Lagarde, en novembre 2012, en forêt de feuillus sur la commune de Rivières (16).

Biblio : littérature courante - GEPR.