



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

## *Xerocomellus ripariellus* (Redeuilh) Šutara

Synonyme : *Xerocomus ripariellus*

Nom français : Bolet des rives

Sous saules, peupliers et aulnes, sur les bords de mares, etc. Chapeau rapidement fissuré, rougeâtre avec teintes rosâtres ou ochracées. Pores jaune verdâtre bleuisant au toucher. Stipe jaune puis rougeâtre vers la base. Chair blanchâtre jaunâtre, bleuisant souvent dans le stipe à mi-hauteur. Spores 11-14 x 4,5-5 µm, finement striées longitudinalement (observation délicate en microscopie optique).

A comparer avec :

- *X. intermedius* (syn. *X. fennicus*) : écologie similaire, spores plus fortement striées avec le sommet tronqué ;
- *X. porosporus* qui se présente parfois sous une forme rouge (cf. notre fiche page 3) : surtout sous chênes, spores non striées à sommet tronqué.

Ce bolet est assez bien caractérisé, il n'est pas très fréquent dans la région, il se rencontre malgré tout de temps en temps de la fin de l'été à l'automne.

Biblio : littérature courante - *Xerocomus* H. Ladurner & G. Simonini - GEPR.





