



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Lyophyllaceae*

***Calocybe buxea var. hypoxantha*** (Joss. & Rioussset) Consiglio & Vizzini

Synonyme : *Lyophyllum hypoxanthum*

Nom français : Lyophylle à lames jaunes

Sous cyprès sur le littoral. Chapeau feutré de blanc, parfois mauve pâle vers la marge. Lames jaune vif. Stipe blanchâtre. Chair immuable et odeur nulle. Spores 4,5-5 x 3,5-4 µm.

*C. buxea* se distinguerait uniquement par son odeur farineuse et la chair noircissant à la coupe, les dernières analyses moléculaires ne séparent pas la variété de l'espèce type, d'où la nouvelle combinaison adoptée ici conformément à RdM cité ci-dessous.

Cette belle et rare espèce est à dénicher dans la litière des vieux cyprès. Selon les années, nous pouvons l'observer sur une période assez longue allant de novembre à mai, sur de nombreuses stations de l'ensemble de l'île de Ré. Nous l'avons également rencontrée sur les îles d'Aix et d'Oléron.

Il est à noter (cf. dernière page) que des exemplaires un peu âgés finissent par noircir, tout comme le fait la chair avec le temps sur des exemplaires coupés.

Biblio : littérature courante - RdM, 2014.





