



Ordre : Agaricales

Famille : Agaricaceae

## ***Coprinus levisticolens*** E. Ludw. & P. Roux

Nom français : Coprin à odeur de chicorée

Dans les terrains meubles ou sur sols sablonneux. Chapeau blanc couvert de squames brunes. Lames rapidement noires. Stipe blanc avec un anneau dans la moitié inférieure, très radicant. Odeur de chicorée. Spores 12-14 x 6,5-9  $\mu\text{m}$  avec un pg (pore germinatif) distinct et excentré.

A comparer surtout avec *C. comatus*.

A noter également l'existence de deux espèces plus ou moins fimicoles :

- *C. sterquilinus* : sur excréments et débris végétaux, chapeau blanc non méchuleux de brun, spores 16-23 x 11-14  $\mu\text{m}$  ;
- *C. spadiceisporus* : petite espèce (chapeau 2-3 cm) peu observée en Europe, spores 8-10,5 x 7-8,5  $\mu\text{m}$  globuleuses à mitriformes.

Coprin peu commun dont la distinction peut paraître peu aisée avec *C. comatus*, un des auteurs d'ailleurs (P. Roux) indique « il serait possible de concevoir le rang variétal pour *levisticolens* ». A ce jour, nous l'avons rencontré par exemple à Chermignac, Royan et Fouras...

Biblio : Mille et un champignons, P. Roux - E. Ludwig, Pilzk. Band 2 - GEPR.



