



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Suillellus mendax (Simonini & Vizzini) Vizzini et coll.

Synonyme : *Boletus mendax*

Sous feuillus, sur sol non calcaire. Chapeau velouté, rouge-rose cramoisi à brun rougeâtre. Pores rouge vif dans la jeunesse puis orange, bleuissants. Stipe orangé rouge, jaune au sommet, avec un réseau mal défini normalement limité au sommet, et des ponctuations dans la moitié inférieure. Chair jaune, bleuisant à la coupe, rouge betterave à la base ; ligne de Bataille souvent présente. Spores 13-15 x 5-5,5 µm.

Ce bolet, en présence d'exemplaires typiques, peut se résumer comme étant un mixte de trois espèces : chapeau rougeâtre et stipe plutôt rouge avec un réseau souvent mal défini limité au sommet (aspect *S. luridus*), base du stipe rouge betterave (aspect *S. queletii*), bas du stipe ponctué (aspect *N. erythropus*). Tout n'est néanmoins pas si simple, cette espèce semble par exemple pouvoir occasionnellement présenter un réseau jusqu'en bas du stipe...

Voir la page 2 de la fiche de *S. luridus* pour un comparatif de quelques espèces proches.

Ce bolet a été récemment décrit et longtemps confondu, preuve qu'il n'est pas aisé d'en cerner tous les contours. Il semble assez fréquent sur le littoral, par exemple sur l'île de Ré et en forêt de La Coubre où nous l'avons rencontré à plusieurs reprises.

Biblio : Mycological progress 2013.



