



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

***Pseudoclitocybe cyathiformis*** (Bull. : Fr.) Singer

Noms français : Clitocybe en vase, Clitocybe en coupe

En forêt, sur bois mort, dans l'humus, etc. Chapeau 3-8(16) cm, plus ou moins en entonnoir, brun sombre, gris-brun à brun ochracé, non hygrophane ou seulement pâissant. Lames grisâtre crème, légèrement décurrentes. Stipe gris-brun, fibrilleux et rayé longitudinalement. Odeur faible. Spores 7,5-12 x 5-6,5 µm, elliptiques à oblongues.

A comparer avec *P. expallens* (syn. *P. obbata*) : plus rare, chapeau plus petit (1,5-4,5 cm) à marge striée, stipe lisse, odeur cyanique, spores 7-10 x 5,5-7 µm largement elliptiques.

Espèce fréquente et très variable, tardive et visible tous les hivers, surtout entre les mois de novembre et de janvier, mais souvent jusqu'en mars ou avril. A noter que nous l'avons également observée sur place à feu et vieille paille.

Biblio : littérature courante - Pilzk. E. Ludwig - Funga nordica - GEPR.

*Fiche réalisée en janvier 2019 par Patrice TANCHAUD*





