



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Dermolomataceae*

Hodophilus cf. phaeoxanthus (Romagn.) Adamčík & Jančovičová

Synonyme : *Camarophyllopsis phaeoxanthus*

Au sol sous feuillus. Chapeau 6-21 mm, hygrophane, brun jaunâtre à brun orangé grisâtre, parfois orangé. Lames décurrentes, subconcolores. Stipe pruneux, jaune à brun orangé au sommet et brun en bas. Odeur et saveur sans particularité. Spores (4,1)4,7-5,5(6,6) x (3,4)3,9-4,5(5) µm. Epicutis hyméniforme.

A comparer avec :

- *H. anatinus* : stipe plus jaune ;
- *H. micaceus* et *H. praecox* : stipe jaune très vif ;
- *H. phaeophyllus* : stipe sans teinte jaune, basidiome plus sombre dans l'ensemble.

Les espèces de ce genre à stipe plus ou moins jaune sont délicates à distinguer, et la littérature récente ne semble rien avoir simplifié, c'est donc avec grand intérêt que nous suivons les publications nouvelles qui ne manqueront certainement pas. En l'état actuel et avec les réserves qui s'imposent, nous attribuons deux récoltes au binôme ici décrit, réalisées en novembre 2013 sur la commune de La Chapelle des Pots.

Biblio : DM Mycological Progress (2018) 17 : 1097-1111 - Errotari 2018.