



Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

## *Humaria hemisphaerica* (Wigg. : Fr.) Fuckel

A terre, parfois sur bois très pourri. Apothécies jusqu'à 3 cm. Hyménium blanchâtre à grisâtre bleuté, marge et excipulum couverts de poils bruns. Spores 20-27 x 10-13 µm, biguttulées et ornées de verrues à maturité. A comparer avec différentes espèces notamment :

- *Aurantiolachnea solsequia*: hyménium orange vif ;
- *Trichophaea hemisphaerioides* : souvent sur place à feu, parfois sur terreau ou débris de bois, spores ressemblantes mais lisses avec deux petites guttules ;
- *Trichophaea flavobrunnea* : spécifique de litière d'aiguilles de *Cupressaceae*, spores différentes.

Attention à *Geopora arenicola* qui peut pousser dans les mêmes milieux et qui ressemble fortement, mais ses spores sont lisses.

A noter également l'existence d'un parasite (formation blanche) qui colonise *H. hemisphaerica*, il s'agit de *Hypomyces stephanomatis*.

Cet ascomycète est fréquent, nous pouvons la rencontrer tous les mois de l'année lorsque les conditions sont favorables, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres. Attention aux récoltes réalisées sous *Cupressus* au vu de l'existence du rare *T. flavobrunnea* qui mesure 6-12 mm de diamètre.

Biblio : littérature courante.



