



Ordre : *Thelephorales*

Famille : *Thelephoraceae*

Thelephora anthocephala Fr.

Sur terre, parmi les mousses et les herbes, dans les forêts de feuillus et de conifères ou dans les clairières. Fructifications dressées ou en rosette, 3-6 cm, se composant de lobes fendus et frangés ou de branches aplaties, de couleurs olive brun à grisâtre lilacin à la base et à sommet blanchâtre. Spores 6-10 x 4,5-8 μm (selon les ouvrages). *T. digitata* est une espèce bien difficile à différencier avec des contradictions dans les dimensions sporales selon les ouvrages. A noter également l'existence de *T. atrocitrina*, peut-être synonyme ... (cf. cette fiche).

Sur nos secteurs de prospection, ces *Thelephora* ne semblent pas très rares sur les bords de chemins, ils sont généralement visibles l'été et l'automne. Mais, selon les ouvrages consultés, tenter de mettre un nom est un vrai parcours du combattant. Dans l'immédiat, nous rattachons nos récoltes réalisées sous feuillus à l'espèce ici présentée. Celle-ci nous semble variable, en effet, nous montrons en page 2 différentes photographies réalisées sur une même station à St Sornin (17), où nous n'avons pas observé de différences sporales.

Biblio : Hyménomycètes de France Bourdot & Galzin - Aphylophorales ... vol. 2 Jülich - Nordic macromycètes vol. 3 - Clé du genre *Thelephora*, Corner - BK2 254 - Guide Vigot p. 686 - Danske Frynsvampe (*Thelephora*), H. Petersen & Vesterholt - Genere *Thelephora* in Friuli, G. Zecchin.





