



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius squameoradicans* Bellivier ex Cheype

Synonyme : *C. maculosus*

Sous chênes. Chapeau 3-7 cm, beige, jaunâtre pâle à brunâtre avec des mèches roussâtres surtout concentrées vers le centre. Lames bleu lilacin puis argilacées. Stipe blanc devenant roussâtre avec des méchules rousses sous la zone annulaire, base clavée et fusiforme. Chair blanche, immuable, à odeur faible de pâtisserie, parfois désagréable le lendemain de la cueillette. KOH sans particularité. Spores 9-11 x 5-5,5 µm.

A comparer avec *C. caligatus* : sous chênes verts, chapeau non squamuleux.

Voir la fiche de *C. vulpinus* pour les espèces plus ou moins ressemblantes.

Cortinaire probablement peu fréquent, les exemplaires présentés ici ont été récoltés en octobre 2019 dans le secteur de Cadeuil, commune de la Gripperie St Symphorien.

Biblio : DM n° 106 (1997) - ADC Bidaud et al. (*C. maculosus*) - GEPR (remarques sous *C. ophiopus*).

*Fiche réalisée en avril 2020 par Patrice TANCHAUD*