



Ordre : *Tuberales*

Famille : *Tuberaceae*

## *Tuber cf. dryophilum* Tulasne & Tulasne

Ascomycète hypogé (vivant dans le sol), associé à différents feuillus. Fructification irrégulière, lisse, blanche puis roux brunâtre maculé de brun rouille. Masse interne blanchâtre au départ, brun clair à roux lilacin à maturité, parcourue de veines blanches. Odeur forte, plutôt désagréable. Spores 30-40 x 25-30  $\mu\text{m}$ , jaunes, ornées d'un réseau, avec des alvéoles irréguliers mesurant 10-20  $\mu\text{m}$  de large. Poils du péridium cylindriques et obtus.

A comparer avec *T. borchii* et *T. maculatum* qui possèdent des spores avec des alvéoles plus petits et réguliers.

En réalité, tout n'est pas si simple, avec d'autres espèces nouvellement décrites et des différences macroscopiques et/ou microscopiques difficiles à cerner, même pour les spécialistes. Pour cette raison, il est prudent aujourd'hui de parler de « groupe *dryophilum* », notamment en présence de ce jeune exemplaire immature, récolté en décembre 2022 sous peuplier en zone humide à Echillais.

Biblio : Funghi ipogei d'Europa, Montecchi & Sarasini - Truffes d'Europe et de Chine, Rioussel, Chevalier & Bardet.