



Ordre : *Clavariales*

Famille : *Clavariaceae*

Clavulinopsis corniculata (Fr.) Corner

Sur terre, dans les prés, parmi les plantes herbacées et les fougères, en forêt. Fructification dichotomiquement ramifiée, jaune à jaune orangé. Odeur souvent farineuse, mais parfois faible ou nulle. Spores 5-7 x 5-6,5 µm, globuleuses.

A comparer avec les espèces du même genre aux couleurs plus ou moins similaires :

- *C. fusiformis*, *C. helvola* et *C. laeticolor* : non ramifiés ;
- *C. gracillima* : peu ramifié.

A noter également l'existence de :

- *Clavulinopsis corniculata* f. *compacta* : distinguerait les récoltes non élancées, mais nous avons l'impression que « tout simplement » les basidiomes venant en milieu herbeux et ensoleillé sont souvent plus trapus que ceux venant en forêt qui sont plus à la recherche de luminosité ;
- *Ramaria murrillii* : très rare en France, dans les milieux herbeux et moussus, souvent sur sol calcaire, jaune pâle à jaune orangé à brun-jaune, spores elliptiques (6-9 x 3-4 µm) et épineuses.

Espèce plutôt fréquente, nous l'observons tous les ans durant la période septembre/janvier, surtout dans les pelouses et autres milieux herbeux sur sol calcaire. Nous avons pu constater, comme l'indique la littérature, que certaines récoltes étaient totalement inodores et d'autres à odeur très fortement farineuse.

Biblio : BK2 446.

