



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

Echinoderma echinaceum (Lge.) Bon

Sous feuillus ou conifères, dans l'humus. Chapeau brun obscur à brun vineux, écailles non contrastées. Lames crème. Stipe couvert de verrues concolores au chapeau. Odeur de « *Lepiota cristata* » ou de bois de cèdre. Spores 4-5,5 x 2,5-3 µm.

Nos récoltes, toutes réalisées sous conifères, pourraient se rapporter à *E. echinaceum* var. *cedriolens*, à teintes vineuses et odeur de bois de cèdre ; mais les différences paraissent assez subtiles pour parvenir à différencier cette variété du type, qui lui pousserait surtout sous feuillus et posséderait des teintes moins sombres.

A comparer avec :

- *E. carinii* : chapeau châtain à beige ochracé ;
- *E. jacobi* (syn. *E. eriophorum*) : chapeau plus clair avec des squames contrastées.

Cette espèce n'est pas très fréquente, elle reste malgré tout visible l'automne et l'hiver, surtout sous les cyprès et mimosas du littoral, et plus occasionnellement à l'intérieur des terres sous les mêmes essences ainsi que sous cèdres.

Biblio : littérature courante - DM HS n° 3 p. 44 - GEPR.

