



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius natalis D. Antonini & M Antonini

Nom français : Cortinaire de la nativité

Description : Chapeau de 5 à 7 cm de diamètre, d'abord convexe puis plan-convexe à marge relevée et sinueuse ; cuticule visqueuse, lisse, remarquablement ornée de plaques vélaires blanchâtres persistantes au disque ; couleur olivacée à jaune olivâtre ; stipe plus ou moins élancé, jaune olivâtre pâle, à bulbe blanc, marginé et subvulvécé ; lames moyennement serrées parfois décurrentes, jaune-olivacé puis rouillées ; chair blanchâtre plus jaunâtre au cortex du stipe, à odeur herbacée ; réactions macrochimiques non réalisées ; spores 10-12 x 5,5-6,5 µm.

Récolte : en 2009 sous chênes verts sur sol calcaire au Douhet (17).

Remarques : ce cortinaire est caractérisé par son chapeau de couleur jaune olivacé orné de résidus vélaires persistants et son bulbe subvulvécé ; il existe une forme à stipe lilacin dénommée *C. natalis* f. *vinostipitatus* (photographie en haut à droite : récolte d'Ardèche).

Biblio : Fungi non delineati 2002, 22 ; p 19-23.