



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius suillus Fr.

Synonymes ss. auct. : *C. aprinus*, *C. strenuipes*, *C. suillonigrescens*

Nom français : Cortinaire des porcs

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau panaché de gris-brun, brun-rouge à brunâtre, souvent taché, fortement vergeté de fibrilles innées. Lames brunâtres, parfois violetées, rouillées à maturité. Stipe massif, couvert d'un voile blanchâtre détersile, laissant apparaître le fond concolore au chapeau. Chair ferme, grisâtre, marbrée de teintes ferrugineuses. Odeur sans particularité. Spores 8,5-11 x 6-7 µm.

A comparer avec :

- *C. sordescens* : teintes plus ternes, mais tout n'est pas si simple... ;
- *C. subferrugineus* : difficile à distinguer mais paraissant différemment interprété selon les auteurs ;
- *C. diffractosuavis* : souvent sous chênes verts, odeur agréable et puissante de frangipane ou d'alcool de poire.

Cortinaire assez répandu dans la région, mais différemment nommé selon les époques, les détermineurs et la littérature utilisée.

Biblio : Flora photographica - ADC Bidaud et al.