



Ordre : Auriculariales

Famille : Exidiaceae

Exidia truncata Fr.:Fr.

Sur bois mort de feuillus. Fructifications brun noir, arrondies discoïdes, assez régulièrement tronconiques. Surface hyméniale ponctuée de verrues isolées. Spores 14-19 x 4,5-5,5 μm . A comparer avec *Exidia glandulosa* qui est nettement cérébriforme avec des spores plus petites et *Bulgaria inquinans* qui est un ascomycète. A noter quelques complications de nomenclature, car si nous suivions Roberts (2009), nous devrions nommer l'espèce présentée ici *Exidia glandulosa* (cf. tableau page 2), mais dans l'attente de voir si ces bouleversements font l'unanimité, nous préférons conserver pour le moment l'usage.

Espèce fréquente, visible à différents moments de l'année par temps humide ; lors des périodes de sécheresse, les fructifications se réduisent et deviennent peu visibles, desséchées sur leur support.

Biblio : BK2 25.

Fiche réalisée en janvier 2016 par Patrice TANCHAUD

France (usage)	Roberts 2009 & GEPR p. 1040	écologie
<i>truncata</i>	glandulosa	Surtout sur chêne et noisetier
<i>glandulosa (= plana)</i>	nigricans	Surtout sur hêtre, saule et érable
Nouvelles données de Roberts (2009), mais que de complications d'un point de vue nomenclature ... !		

