



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

Amanita beckeri Huijsman

Synonyme : *Amanita brunneocunulus*

Généralement sous chênes sur sol calcaire. Stature élancée. Chapeau d'hémisphérique à ovoïde, ocre orangé à beige noisette, avec des flocons ocre-brun ou brun tabac, marge longuement cannelée. Stipe zébré d'ochracé. Volve fragile blanchâtre tachée d'ochracé. Spores globuleuses à subglobuleuses, 9-11 μm . A comparer notamment avec *A. dryophila* de stature plus puissante et à voile général pâle et avec *A. inaurata* à flocons grisâtres sur le chapeau.

Espèce rare sur nos lieux de prospection puisque nous n'en avons jamais entendu parler jusqu'à cette récolte (leg. M. S.), réalisée sur la commune du Douhet le 8 août 2011. Une vingtaine de basidiomes étaient présents, à divers stades de développement, en petits groupes de 2 à 5 exemplaires, sur sous-sol calcaire ayant donné naissance à des sols bruns. Strate arborescente constituée essentiellement de chênes pubescents, chênes verts et érables de Montpellier.

Biblio : Le Amanite Galli p. 104 photographie du bas - Macau & Perez de Gregorio (2012) Riv. Catalana Micol., 33 : 92-93 - Gerhardt & al. (2000) Hongos de España y de Europa : 586 haut (sous le nom de brunneocunulus) - Pirot (2004) Mycolux 3 : 18 et 27 - Miscellanea Mycologica 2004 (80-81) couverture.

Fiche réalisée en août 2015 par Michel SANDRAS & Patrice TANCHAUD