



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Lactarius fuliginosus (Fr. : Fr.) Fr.

Nom français : Lactaire enfumé

Sous feuillus. Chapeau velouté, brun à café au lait grisâtre, marge lisse (parfois un peu festonnée). Lames crème ochracé, serrées. Stipe pâle à subconcolore au chapeau. Lait blanc, rosissant sur les lames, assez âcre. Spores 7,5-8,5 x 6,5-7,5 µm, avec de courtes crêtes (aussi nommé à ornementation basse) et un réseau presque complet. Espèce appartenant à la Section, parfois délicate à appréhender, des *Plinthogali*. Voir par exemple :

- *L. romagnesii* : sous hêtres, chapeau brun chaud avec la marge enroulée et souvent cannelée, lames espacées, saveur douce à peu amère, lait immuable à lentement rose sale, spores avec de fortes crêtes « ailées » avec un réseau bien formé ;
- *L. ruginosus* : sous hêtres, sosie de *L. romagnesii* à chapeau plus pâle, marge du chapeau festonnée, lait rosissant, âcre ;
- *L. pterosporus* : sous feuillus (hêtres, chênes et charmes), chapeau ridulé, lames serrées, saveur du lait assez âcre, spores avec des « ailes » très prononcées ;
- *L. acris* : sous hêtres, chapeau gras visqueux, blanchâtre à ochracé grisâtre pâle, lait abondant vite rose-rouge, spores avec de fortes crêtes ;
- *L. azonites* : surtout sous chênes, chapeau assez pâle, stipe blanc, saveur douce ou un peu âcre, lait rapidement rosissant, spores avec un réseau peu formé ;
- *L. subruginosus* : souvent sous hêtres, saveur douce, odeur de noix de coco.

Lactaire moyennement fréquent dans la région, assez souvent présent sous hêtres. A noter page 3, deux photographies présentant une récolte réalisée sous feuillus purs, à chapeaux très sombres pouvant rappeler les teintes de *L. picinus*, espèce montagnarde liée à l'épicéa, à spores similaires...

Biblio : littérature courante.



