



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

## *Leucoagaricus badhamii* (Berk. & Br.) Singer

Nom français : Lépiote de Badham

En forêt, dans les taillis, les parcs. Chapeau velouté, fibrillo-squamuleux de crème ochracé ou brunâtre sur fond pâle. Lames crème, rougissant vivement. Stipe pâle à subconcolore au chapeau portant un anneau simple. Cuticule et chair réagissant en vert à l'ammoniaque. Spores 7-8,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à fusiformes, prolongées par un col plus ou moins long avec étranglements. Espèce assez robuste qui rougit vivement au toucher puis noircit.

A comparer par exemple avec :

- *L. croceovelutinus* : NH3 orange, réagit en orange au moindre frottement, puis brunit/noircit ;
- *L. georginae* : NH3 vert, très petite espèce rougissante ;
- *L. pilatianus* : NH3 vert, brunit lentement (aucun rougissement vif) ;
- *L. babosiae* : chapeau rosâtre lilacin, rougissement moins vif et brunit sans noircir ;
- *L. aurantiovergens*, *L. marginatus*, *L. croceobasis* et *L. cupresseoides* sont à comparer pour des récoltes sous *Cupressus* : cheilocystides sans col.


Nous rencontrons cette espèce surtout sous les *Cupressus*, parfois sous feuillus ou dans les parterres en ville, à l'intérieur des terres comme sur le littoral, notamment entre les mois d'octobre et de janvier.

Biblio : littérature courante - DM HS n° 3 - GEPR.













NH3





*cheilos*

