



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius rapaceoides* Bidaud, G. Riousset & Riousset

Sous chênes sur sol calcaire. Chapeau très visqueux, glabre ou peu fibrilleux, jaunâtre à jaunâtre ochracé, non ou peu taché. Lames carnées à reflets lilacins puis ochracé rouillé. Stipe blanchâtre, parfois gris violacé au sommet, avec un bulbe marginé nettement développé, couvert de voile fibrilleux. Chair blanchâtre, parfois bleutée au sommet du stipe et dans le bulbe (envisager alors *C. flavidolilacinus*). Odeur de brioche puis très chocolatée, saveur douce. KOH brun acajou sur la cuticule. Spores 9,5-13 x 6-7 µm.

Voir les fiches de *C. rapaceotomentosus* et *C. caroviolaceus* qui sont des espèces très proches. Par contre, des récoltes à odeur miellée doivent être comparées avec des cortinaires du groupe de *C. subturbinatus*. Egalement, comme indiqué ci-dessus, avec une chair bleutée envisager *C. flavidolilacinus*.

De tels cortinaires semblent visibles occasionnellement l'automne, particulièrement en novembre, par exemple en forêts de feuillus à Soulignonne, Pont l'Abbé d'Arnoult, etc.

Biblio : Micologia 2000 p. 68-70 - BGMB 47 (3) : 13-31 (2004) - GEPR (observations sous *C. caroviolaceus*).

*Fiche réalisée en janvier 2024 par Patrice TANCHAUD*