



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

Leucoagaricus griseodiscus (Bon) Bon & Migl.

En forêt, dans les taillis, espèce thermophile des fourrés et lisières. Chapeau blanc plus ou moins couvert de squames bistre grisâtre, avec la calotte discale lisse brun noirâtre. Lames blanches. Stipe blanc légèrement clavé à la base, anneau en manchette souvent plus ou moins caduque mais bordé de gris bistre. Spores 6-8 x 4-5 µm. Cheilocystides ventrues, lagéniformes ou fusiformes.

A comparer surtout avec :

- *L. fulgineodiffractus* : (bien ingrat à distinguer) plutôt méditerranéen, anneau non ou peu bordé, cheilocystides ventrues ;
- *L. cinereoradicatus* : sous cyprès, chapeau presque totalement gris fuligineux, stipe radican, spores supérieures (8,5-10,5 x 4,2-5,3 µm).


Nous avons trois récoltes de cette rare espèce :


- sur l'île de Ré, sous cyprès (photographies ci-dessus et page 2) ;
- à St Porchaire, sous un séquoia (photographie ci-contre).

Biblio : DM HS n° 3 p. 94.





cutic.







cutic.



cheilos



cheilos



cutic.

