



Ile de Ré, nov. 2010



Magnac-Lavalette (16), août 2014



Ile de Ré, janv. 2008

Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Rhodocybe fallax (Quélet)Singer

Nom français : Rhodocybe trompeur

Sous conifères ou feuillus. Chapeau, blanc, puis blanc sale, crème à ochracé, plus ou moins craquelé à maturité. Lames crème jaunâtre puis roses. Stipe subconcolore au chapeau. Odeur faible à farineuse, saveur farineuse à légèrement amère. Sporée rose. Spores 5-7 x 3-4,5 µm, bosselées et finement verruqueuses. A comparer avec :

- *Clitopilus prunulus* (chair fragile et cassante) et *Clitopilus cystidiatus* (chair non cassante) : spores nettement plus grandes ;
- de nombreux clitocybes blancs : sporée blanche.

Ce *Rhodocybe* est rare puisqu'à ce jour nous ne le connaissons que sur deux stations. Il est par contre bien installé sur l'île de Ré, commune de la Flotte en Ré, sur un emplacement sous *Cupressus* où nous l'observons chaque hiver.

Biblio : littérature courante.

Fiche réalisée en juin 2016 par Patrice TANCHAUD

