



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

Arrhenia elegans (Pers.) Redhead et coll.

Synonymes : *Phaeotellus rickenii*, *A. rickenii*

- Nom français : Omphale de Ricken

Sur les mousses des pelouses ou des vieux murs. Chapeau jusqu'à 2,5 cm, brun grisâtre, ondulé, strié, souvent zoné et creusé au centre. Lames subconcolores, espacées, fourchues anastomosées et décurrentes. Stipe brun grisâtre. Spores 6-9 x 3,5-5 µm. Boucles absentes aux cloisons des hyphes.

A comparer avec :

- *A. bryophthora* (décrit en 2024) : parmi les mousses (*Funaria hygrometrica* et *Ceratodon purpureus*) en milieux incendiés, chapeau non creusé, boucles également absentes, spores 7,2-9,4 x 4,3-6 µm ;
- *A. settii* : parmi les mousses, chapeau brun-gris, lames bien formées, boucles absentes, spores nettement plus petites (5,5-6,5 x 3-3,5 µm) ;
- *A. griseopallida* : plus sombre et boucles présentes ;
- *A. peltigerina* : assez rare, poussant sur *Peltiger* (lichen), boucles présentes.

Espèce très fréquente à l'intérieur des terres et sur le littoral. Nous pouvons l'observer tous les ans, particulièrement entre les mois d'octobre et de février, par exemple sur les mousses des murs, des sols bétonnés ou goudronnés, sur places à feu...

Biblio : littérature courante.





