



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Bolbitiaceae*

Panaeolus dunensis Bon & Courtecuisse

Nom français : Panéole des dunes

Dans les dunes, les pelouses dunaires ou arrière-littorales. Chapeau 1-2 cm, souvent cabossé, plus ou moins hygrophane, brun noirâtre, châtain foncé à beige brunâtre. Lames grisâtres puis noirâtres. Stipe pruineux, gris brunâtre. Spores 11-15 x 5-9 µm, elliptiques. Chrysocystides absentes.

A noter que cette espèce est synonymisée par certains auteurs à *P. cinctulus*, par d'autres à *P. fimicola* (c'est dire si ce genre est bien confus et reste à débrouiller), interprétations que nous ne partageons pas et motivées sur ces fiches.

Avec une écologie similaire, *P. obliquoporus* est un taxon ressemblant qui se distinguerait par la présence de chrysocystides, il est néanmoins synonymisé à *P. fimicola* par quelques auteurs ...

Cette espèce est visible chaque année sur l'ensemble de notre littoral atlantique, souvent par exemple à la base des oyats, notamment l'automne et l'hiver durant les périodes humides.

Biblio : littérature courante - Champignons des dunes Jacques Guinberteau.

Fiche réalisée en août 2015 par Patrice TANCHAUD

