



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Bolbitiaceae*

Panaeolus papilionaceus (Bull. : Fr.) Quélet

Synonymes : *P. sphinctrinus* (teintes verdâtres et marge très dentée) ; *P. retirugis* (chapeau roussâtre et craquelé) ; *P. campanulatus* (chapeau grisâtre).

Noms français : Panéole papillonacé, campanulé, à bord denté.

Sur bouses et crottins, sur fumier. Chapeau de teintes variables, beige ochracé, gris-brun, gris verdâtre à gris blanchâtre, marge appendiculée de restes de voile blanc dans la jeunesse. Lames grisâtres puis noirâtres. Stipe subconcolore au chapeau, prumineux. Spores 13-17 x 8-12 µm. Chrysocystides absentes.

Nous partageons l'avis des auteurs qui synonymisent les espèces citées ci-dessus, en effet nous constatons une grande variabilité des chapeaux de nos récoltes, tantôt sur un même peuplement, tantôt sur des basidiomes dont nous avons pu suivre l'évolution sur quelques jours, les chapeaux passant de lisses à craquelés lorsqu'ils sont exposés au soleil, les couleurs paraissant également fort variables pour les mêmes raisons. Ce panéole est très fréquent dans son écologie, il ne semble pas avoir d'exigences quant à la période d'apparition puisque nous l'avons observé tous les mois de l'année.

Biblio : littérature courante - Pilzk. 1 - Funga nordica - GEPR.











