



Ordre : *Leotiales*

Famille : *Hyaloscyphaceae*

Lachnum rhytismatis s.l. (Phill.) Nannf.

Synonymes : *Dasyscyphus rhytismatis*, *Lachnum minutissimum*

Sur feuilles. Apothécies inférieures à 0,5 mm, blanc crème ; marge et face externe garnies de poils concolores. Spores 5-6 x 1,5-1,7 μm en forme de menhirs. Poils cloisonnés coiffés de cristaux au sommet. Paraphyses lancéolées dépassant nettement les asques.

A noter qu'il s'agit-là d'un groupe restant à débrouiller. Les récoltes avec crochet à la base, poussant sur feuilles d'érables (surtout érable platane) et de chênes, sont provisoirement nommées *L. aceriphilum* (binôme non publié).

Ce petit ascomycète n'est pas rare dans la région, il est généralement déniché au printemps et l'été lors de recherches spécifiques parmi les feuilles mortes humides au sol. Nous l'observons sur feuilles de chêne, cette écologie et la présence de crochets à la base des asques nous permettront probablement de nommer nos récoltes *L. aceriphilum* lorsque ce taxon sera officialisé.

Biblio : Ellis p. 78 - BK1 225 - DVD H.-O. Baral.