



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius quercilicis* (Chevassut & R. Henry)R. Henry

Synonymes : *C. eufulmineus* ss. *auct.*, *C. cereifolius* ss. *auct.*

Nom français : Cortinaire du chêne vert

Sous feuillus sur sol calcaire, plutôt sous chênes. Chapeau visqueux, jaune olivâtre rapidement châtain à brun cuivré par le centre, souvent avec des petits lambeaux de voile brun. Lames jaune soufre à jaune verdâtre puis ochracé rouillé. Stipe jaunâtre avec un bulbe marginé enveloppé d'un voile brun-jaune ; mycélium souvent jaunâtre. Chair blanchâtre, un peu jaunâtre dans le stipe. Odeur et saveur sans particularité. KOH subnul à brunâtre sur cuticule et chair.

Voir la fiche de *C. fulminatus* pour quelques espèces proche, à comparer également avec :

- *C. xanthochlorus* : teintes olivâtres plus nettes, KOH brun pourpre sur la cuticule, mycélium blanc ou violet ;
- *C. elegantior* : sous conifères, KOH rouge sur la chair du bulbe

En présence de ces cortinaires, nous avons souvent hésité entre celui que nous avons adopté et ceux placés comme synonymes. Les différences très ténues semblent peu significatives vu les synonymies avancées dans l'ouvrage *Funga nordica*, position que nous adoptons donc pour le moment. La majorité de nos récoltes a été réalisée l'automne, en présence de chênes verts à l'intérieur des terres, par exemple à Soullignonne et Pont l'Abbé d'Arnoult.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al.- *Funga nordica* - GEPR p. 748.

