



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quélet

Nom français : Bolet à chair jaune

Sous pins, exceptionnellement sous hêtres. Chapeau de teintes variables, brun plus ou moins sombre, brun rouge à gris jaune, vite craquelé et laissant apparaître la chair sous-jacente rose-violeté. Pores jaunes puis verdâtres, plus ou moins bleuissants. Stipe vineux rougeâtre, jaune au sommet. Chair non bleuissante ou à peine à la jonction stipe-chapeau, vineux rougeâtre dans le stipe ; base brun terne plus ou moins olivâtre. Spores 11-17 x 4,5-5,5 µm. A comparer surtout avec *X. cisalpinus* (cf. cette fiche) et quelques espèces du même genre.

Ce bolet est assez fréquent dans son écologie de prédilection, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres. Nous remercions notamment MM Guillaume Eyssartier et Paul Berteau pour les nombreuses explications qu'ils ont bien voulu nous fournir sur ce genre en général.

Biblio : littérature courante - *Xerocomus* H. Ladurner & G. Simonini - GEPR p. 80.

Fiche réalisée en avril 2016 par Patrice TANCHAUD

