



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

## *Leccinum cyaneobasileucum* Lannoy & Estades (Lannoy & Estades)

Sous bouleaux. Chapeau blanchâtre. Pores blanchâtres puis brun grisâtre. Stipe blanchâtre, finement méchuleux. Chair blanchâtre, rosâtre à la coupe dans le stipe mais pas dans le chapeau, souvent bleu vert à la base du stipe. Spores 15-20 x 4-6,5  $\mu\text{m}$ . Des champignons à description identique, mais avec chapeau brun à brun grisâtre, sont nommés *L. cyaneobasileucum* var. *brunneogriseolum*. À comparer avec *L. holopus*, également blanchâtre, en cas de doute la microscopie peut les séparer, les spores de ce dernier étant plus larges.

Ce bolet, pris dans son sens strict, donc avec chapeau blanchâtre, nous semble rare dans la région, notre seule récolte ainsi déterminée a été réalisée en octobre 2014 en forêt de l'Hermitain (79).

Biblio : Monographie *Leccinum* d'Europe G. Lannoy et A. Estades - H.C. Den Bakker & M. E. Noordeloos (2005) : A revision of European species of *Leccinum* Gray and notes on extralimital species, *Persoonia* 18(4) - GEPR p. 72